



LABORATOIRES
Picot

Depuis 1896

**FICHES
POSOLOGIQUES**

NUTRITION INFANTILE

La joie des petits
fait le bonheur
des grands

SEPTEMBRE 2026

Picot Pepti-Junior®

Avec
Pepti-Junior,
faites de l'**APLV**
un jeu d'enfant !



DADFMS*

**EXPERT DE
L'ALLERGIE
DEPUIS
40 ANS**

LABORATOIRES
Picot
Pepti-Junior®

*Picot Pepti-Junior Hydrolysat de Caséine, Hydrolysat de Caséine AR, Riz et Riz AR
sont des Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales

SOMMAIRE

Nutrition quotidienne



Croissance et Junior



**Troubles Fonctionnels
Gastro-Intestinaux**



Pepti-Junior



Picot BIO



Picot Bébé Gourmand



Picolite



Épaississants



Diversification



Tisanes d'allaitement



Nutrition
quotidienne

Croissance
et Junior

TFGI

Pepti-Junior

Picot BIO

Picot Bébé
Gourmand

Picolite

Épaississants

Diversification

Tisanes
d'allaitement



LABORATOIRES
Picot
Depuis 1896

Une composition plus proche du lait maternel pour le confort digestif des bébés

Un système **unique** et **breveté**¹
d'ingrédients laitiers,
issu de notre R&D

Avec Système
TRILACTA

**LIPIDES
LAITIERS
À 50%***¹

**PROTÉINES
LAITIÈRES
PROLACTA®**²

**LACTOSE
uniquement****

UN TRANSIT OPTIMISÉ GRÂCE À DES SELLES PLUS SOUPLES³

**LIPIDES
LAITIERS
À 50%***

- -50% de savons calciques (avec les formules Picot 1, 2, 3 & 4 Nutrition Quotidienne vs formules 100% huiles végétales)⁴
- Grâce à l'acide palmitique naturellement présent en position sn-2 dans les lipides laitiers

Les SEULES formules infantiles avec 50% de lipides laitiers*

DES PROTÉINES PROLACTA® MIEUX DIGÉRÉES⁵

**PROTÉINES
LAITIÈRES
PROLACTA®**

- Profil AA plus proche du lait maternel
- Meilleur score de digestibilité que les protéines classiques de lait
- Rapport caséine / protéines solubles : 40/60

PDCAAS : score d'aminogramme
corrigé par la digestibilité



ENRICHISSEMENT DU MICROBIOTE INTestinal⁶

**LACTOSE
uniquement****

- Augmentation de la quantité de Lactobacilles⁷
- Augmentation de la population de Bifidobactéries⁷

Retrouvez Trilacta dans



* Par rapport aux lipides totaux des formules. ** Lactose uniquement pour la nutrition quotidienne, lactose réduit pour Picogest. **1. Brevet d'application EP09745999** « Utilisation d'une source de matière grasse d'origine laitière pour l'obtention d'au moins 30% de la fraction lipidique d'un aliment infantile pour nourrisson ou enfant en bas âge, sous forme liquide, solide ou sous forme de poudre à reconstituer, et d'une source de matière grasse végétale pour le reste de cette fraction lipidique, pour la fabrication dudit aliment infantile destiné à l'amélioration de la fonction digestive ». **2.** Directement issu du lait, Prolacta® est un concentré de protéines riche en acides aminés essentiels et particulièrement en Leucine, un acide aminé branché essentiel (BCAA).

3. Manios Y, et al. Effect of milk fat-based infant formulae on stool fatty acid soaps and calcium excretion in healthy term infants: two double-blind randomised cross-over trials. BMC Nutr. 2020 Sep 14;6:46. **4.** Yao M, et al. Effects of term infant formulas containing high sn-2 palmitate with and without oligofructose on stool composition, stool characteristics, and bifidogenicity. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Oct;59(4):440-8. **5.** Gmoshinskii, et al. Demkina. Membrane technologies — an innovative method of protein biological value increasing in young children feeding. Voprosy Sovremennoj Pediatrii 11, 57-64 (2012). **6.** Fukushima Y, et al. Effect of a probiotic formula on intestinal immunoglobulin A production in healthy children. Int J Food Microbiol. 1998 Jun 30;42(1-2):39-44. **7.** Daly K, et al. Dietary supplementation with lactose or artificial sweetener enhances swine gut Lactobacillus population abundance. Br J Nutr. 2014 Jun;111 Suppl 1:S30-5.

Nutrition quotidienne

Laits infantiles répondant aux besoins
nutritionnels spécifiques de bébé*



Une composition plus proche du lait maternel



* Conformément à la réglementation. ** Par rapport aux lipides totaux des formules. *** Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant.

1. Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. 2. Fukushima Y, et al. Effect of a probiotic formula on intestinal immunoglobulin A production in healthy children. Int J Food Microbiol. 1998 Jun 30;42(1-2):39-44.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		1 ^{er} âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%	2 ^e âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%
ÉNERGIE			
	kJ	286	286
	kcal	68	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,5	3,5
Dont acides gras saturés	g	1,3	1,3
Dont acide Linoléique	mg	446	446
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	55,4	55,4
Dont ARA	mg	16,2	16,2
Dont DHA	mg	16,2	16,2
GLUCIDES	g	7,9	7,9
Dont sucres	g	7,9	7,9
Dont lactose	g	7,9	7,9
PROTÉINES	g	1,3	1,3
Dont caséines	g	0,5	0,5
Dont protéines de sérum	g	0,8	0,8
VITAMINES			
Vitamine A	µg ER	52,0	52,0
Vitamine D	µg	1,5	1,5
Vitamine E	mg α-ET	2,3	2,3
Vitamine K	µg	8,1	8,1
Vitamine C	mg	13,5	13,5
Thiamine (B1)	µg	94,5	94,5
Riboflavine (B2)	µg	169	169
Niacine (B3/PP)	mg	0,68	0,68
Vitamine B6	µg	60,8	60,8
Folate (B9)	µg EFA	26,3	26,3
Vitamine B12	µg	0,23	0,23
Biotine (B8/H)	µg	2,7	2,7
Acide panthothénique (B5)	mg	0,47	0,47
SELS MINÉRAUX			
Sodium	mg	23,0	23,0
Potassium	mg	74,3	74,3
Chlorure	mg	56,7	56,7
Calcium	mg	60,8	67,5
Phosphore	mg	33,8	37,8
Magnésium	mg	6,8	6,8
Fer	mg	0,54	1,0
Zinc	mg	0,46	0,46
Cuivre	µg	47,3	47,3
Manganèse	µg	13,5	13,5
Sélénium	µg	4,1	4,1
Iode	µg	13,5	13,5
Fluorure	µg	< 68,3	< 68,3
AUTRES			
Choline	mg	25,7	25,7
Inositol	mg	6,8	6,8
L-carnitine	mg	2,0	2,0

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

1^{er} âge : Lactose (**lait**), crème (**lait**), huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), **lait** écrémé, protéines solubles de **lait**, minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, citrate trisodique, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, citrate tricalcique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, citrate tripotassique, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait**), huile de **Mortierella alpina** (**lait**), émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

2^{ème} âge : Lactose (**lait**), crème (**lait**), huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), **lait** écrémé, protéines solubles de **lait**, minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, citrate trisodique, sulfate ferreux, sulfate de magnésium, hydroxyde de potassium, citrate tricalcique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, citrate tripotassique, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait**), huile de **Mortierella alpina** (**lait**), émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

Croissance[^]

Pour les bébés bien portants dès 10 mois



3551101545367

= 800 g

SANS
HUILE DE
PALME

↑ LE CALCIUM
ET LA VITAMINE D
SONT NÉCESSAIRES À
UNE CROISSANCE ET À
UN DÉVELOPPEMENT
OSSEUX NORMAUX
DES ENFANTS*

Une composition plus proche du lait maternel



DHA*
Développement cérébral
et visuel¹



Probiotiques BB-12*
Participent au renforcement
du microbiote intestinal²

Picot Croissance apporte :

- 13 fois plus de fer (contribue au fonctionnement normal du système immunitaire)
- 2,6 fois moins de protéines
- 18 fois plus d'acides gras essentiels

que le lait demi-écrémé UHT***

Ce produit doit être utilisé dans le cadre
d'une alimentation diversifiée.

Valeurs nutritionnelles moyennes

Dès 10 mois

pour 100 ml
reconstitués à 13,5%

ÉNERGIE	kJ	286
	kcal	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,5
Dont acides gras saturés	g	1,3
Dont acide Linoléique	mg	446
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	55,4
Dont DHA	mg	16,2
GLUCIDES	g	7,9
Dont sucres	g	7,9
Dont lactose	g	7,9
PROTÉINES	g	1,3
Dont caséines	g	0,5
Dont protéines de sérum	g	0,8
VITAMINES		
Vitamine A	µg ER	52,0
Vitamine D	µg	1,5
Vitamine E	mg α-ET	2,3
Vitamine K	µg	8,1
Vitamine C	mg	8,1
Thiamine (B1)	µg	94,5
Riboflavine (B2)	µg	169
Niacine (B3/PP)	mg	0,68
Vitamine B6	µg	60,8
Folates (B9)	µg-EFA	26,3
Vitamine B12	µg	0,23
Biotine (B8/H)	µg	2,7
Acide pantothénique (B5)	mg	0,47
SELS MINÉRAUX		
Sodium	mg	23,0
Potassium	mg	74,3
Chlorure	mg	56,7
Calcium	mg	71,6
Phosphore	mg	40,5
Magnésium	mg	6,8
Fer	mg	1,1
Zinc	mg	0,46
Cuivre	µg	47,3
Manganèse	µg	13,5
Sélénium	µg	4,1
Iode	µg	13,5
Fluorure	µg	< 68,3
AUTRES		
Choline	mg	25,7
Inositol	mg	6,8
L-carnitine	mg	2,0

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients : Lactose (*lait*), crème (*lait*), huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), *lait* écrémé, protéines solubles de *lait*, minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, citrate trisodique, sulfate ferreux, sulfate de magnésium, hydroxyde de potassium, citrate tricalcique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, citrate tripotassique, sulfate de manganèse), huile de *poisson* (*lait*), émulsifiant (lécithine de *soja*), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

* DHA = acide docosahexaénoïque, conformément à la réglementation relative aux préparations de suite. ** Par rapport aux lipides totaux des formules. *** Lait demi-écrémé UHT, Cical 2025. 1. Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. *Am J Clin Nutr.* 2010 Apr;91(4):848-59. 2. Fukushima Y, et al. Effect of a probiotic formula on intestinal immunoglobulin A production in healthy children. *Int J Food Microbiol.* 1998 Jun 30;42(1-2):39-44.

Junior Système Immunitaire*

Pour les enfants en bas âge dès 18 mois




3551102469525

= 850 g

SANS
HUILE DE
PALME

* FORMULE SOURCE
DE VITAMINE D, DE
FER ET DE ZINC QUI
CONTRIBUENT AU
FONCTIONNEMENT
NORMAL DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE

Une composition unique et bien acceptée



DHA*
Développement cérébral
et visuel¹



Goût plus proche du lait
de vache pour les enfants
qui boudent leur formule
Croissance²

Picot Junior apporte :

- Du Zinc
 - 16 fois plus de fer
 - 25 fois plus de vitamine D
- que le lait demi-écrémé UHT***

Ce produit doit être utilisé dans le cadre
d'une alimentation diversifiée.

Valeurs nutritionnelles moyennes

Dès 18 mois

pour 100 ml
reconstitués à 13,5%

ÉNERGIE	kJ	286
	kcal	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,5
Dont acides gras saturés	g	1,3
Dont acide linoléique	mg	446
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	55,4
Dont DHA	mg	8,1
GLUCIDES	g	7,9
Dont sucres	g	7,9
Dont lactose	g	7,9
PROTÉINES	g	1,3
Dont caséines	g	0,5
Dont protéines de sérum	g	0,8
SEL	g	0,06
VITAMINES		
Vitamine A	µg ER	52,0
Vitamine D	µg	2,5
Vitamine E	mg α-ET	2,3
Vitamine K	µg	8,1
Vitamine C	mg	8,1
Thiamine (B1)	mg	0,09
Riboflavine (B2)	mg	0,17
Niacine (B3/PP)	mg	0,68
Vitamine B6	mg	0,06
Folates (B9)	µg-EFA	26,3
Vitamine B12	µg	0,23
Biotine (B8/H)	µg	2,7
Acide pantothénique (B5)	mg	0,47
SELS MINÉRAUX		
Sodium	mg	23,0
Potassium	mg	74,3
Chlorure	mg	56,7
Calcium	mg	71,6
Phosphore	mg	40,5
Magnésium	mg	6,8
Fer	mg	1,4
Zinc	mg	0,46
Cuivre	µg	0
Manganèse	µg	0,01
Sélénium	µg	4,1
Iode	µg	13,5
AUTRES		
Choline	mg	25,7
Inositol	mg	6,8
L-carnitine	mg	2,0

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients : Lactose (*lait*), crème (*lait*), huiles végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), *lait* écrémé, protéines solubles de *lait*, minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, citrate trisodique, sulfate de magnésium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, émulsifiant (lécithine de tournesol)), hydroxyde de potassium, citrate tricalcique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, citrate tripotassique, sulfate de manganèse), huile de *poisson* (*lait*), émulsifiant (lécithine de *soja*), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

*DHA = acide docosahexaénoïque. **Par rapport aux lipides totaux de la formule. ***Lait demi-écrémé UHT, Cical 2025. 1. Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. 2. Goût plus proche du lait de vache grâce à la suppression du cuivre et l'emploi de fer encapsulé.

Picogest

Formule pour les régurgitations bénignes,
coliques et troubles du transit



Nouvelle
formule



Picogest 1 / 0-6 mois
3551101547934




Picogest 2 / 6-12 mois
3551101547941

= 800 g

SANS
HUILE DE
PALME

Une composition plus proche du lait maternel



ARA & DHA : ratio 1:1
Développement cérébral
et visuel¹



Probiotiques BB-12®
Participent au renforcement
du microbiote intestinal²



Fibres FOS / GOS
Amélioration du confort
digestif et régulation du
transit³



Amidon de maïs
Épaississement pour limiter
les régurgitations bénignes⁴

Répond aux critères de choix nutritionnels établis par l'AFPA⁵

* Par rapport aux lipides totaux de la formule. ** Lactose réduit par rapport aux formules nutrition quotidienne 1 et 2.
1. Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. 2. Fukushima Y, et al. Effect of a probiotic formula on intestinal immunoglobulin A production in healthy children. Int J Food Microbiol. 1998 Jun 30;42(1-2):39-44.
3. Moro G, et al. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002 Mar;34(3):291-5. 4. Xinias I, et al. An antiregurgitation milk formula in the management of infants with mild to moderate gastroesophageal reflux. Curr Ther Res Clin Exp. 2003 Apr;64(4):270-8.
5 AFPA : Association Française de Pédiatrie Ambulatoire. Critères 1er âge : Protéines $\leq 1,33$ g/100 ml, ARA et DHA > 14 mg/100 ml avec ARA au moins = DHA, Sodium ≤ 24 mg/100 ml. Critères 2e âge : 2e âge : Protéines $\leq 1,38$ g/100 ml, Sodium ≤ 25 mg/100 ml, 0,84 mg/100 ml < Fer $\leq 1,30$ mg/100 ml.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		1 ^{er} âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%	2 ^e âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%
ÉNERGIE			
	kJ	279	279
	kcal	67	67
MATIÈRES GRASSES	g	3,5	3,5
Dont acides gras saturés	g	1,3	1,3
Dont acide Linoléique	mg	412	412
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	56,7	56,7
Dont ARA	mg	16,2	16,2
Dont DHA	mg	16,2	16,2
GLUCIDES	g	7,1	7,1
Dont sucres	g	4,9	4,9
Dont lactose	g	4,7	4,7
Dont amidon	g	1,8	1,8
FIBRES ALIMENTAIRES	g	0,8	0,8
Dont GOS	g	0,7	0,7
Dont FOS	g	0,1	0,1
PROTÉINES	g	1,3	1,3
Dont caséïnes	g	0,4	0,4
Dont protéines de sérum	g	0,9	0,9
VITAMINES			
Vitamine A	µg ER	52,0	52,0
Vitamine D	µg	1,5	1,5
Vitamine E	mg α-ET	2,3	2,3
Vitamine K	µg	8,1	8,1
Vitamine C	mg	13,5	13,5
Thiamine (B1)	µg	94,5	94,5
Riboflavine (B2)	µg	169	169
Niacine (B3/PP)	mg	0,68	0,68
Vitamine B6	µg	60,8	60,8
Folates (B9)	µg EFA	26,3	26,3
Vitamine B12	µg	0,23	0,23
Biotine (B8/H)	µg	2,7	2,7
Acide pantothénique (B5)	mg	0,47	0,47
SELS MINÉRAUX			
Sodium	mg	23,0	23,0
Potassium	mg	74,3	74,3
Chlorure	mg	56,7	56,7
Calcium	mg	60,8	67,5
Phosphore	mg	33,8	37,8
Magnésium	mg	6,8	6,8
Fer	mg	0,54	1,0
Zinc	mg	0,46	0,46
Cuivre	µg	47,3	47,3
Manganèse	µg	13,5	13,5
Sélénium	µg	4,1	4,1
Iode	µg	13,5	13,5
Fluorure	µg	< 66,7	< 66,7
AUTRES			
Choline	mg	25,7	25,7
Inositol	mg	6,8	6,8
L-carnitine	mg	2,0	2,0

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

1^{er} âge : Lactose (**lait**), crème (**lait**), amidon, matières grasses végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), **lait** écrémé, lactosérum déminéralisé (**lait**), fibres (galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides) (**lait**), protéines solubles de **lait**, minéraux (citrate tripotassique, phosphate tricalcique, citrate trisodique, chlorure de calcium, citrate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de magnésium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait**, **soja**), huile de *Mortierella alpina* (**lait**), émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, L-phénylalanine, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols), vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B1, B2, B12, B6, D, B9, B8), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).
2^{ème} âge : Lactose (**lait**), crème (**lait**), amidon, matières grasses végétales (colza, tournesol oléique, tournesol), **lait** écrémé, lactosérum déminéralisé (**lait**), fibres (galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides) (**lait**), protéines solubles de **lait**, minéraux (phosphate tricalcique, citrate tripotassique, citrate trisodique, chlorure de calcium, sulfate ferreux, citrate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait**, **soja**), huile de *Mortierella alpina* (**lait**), émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, L-phénylalanine, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols), vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B1, B2, B12, B6, D, B9, B8), inositol, L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

Picot AR

Formule **anti-régurgitations** à base de **caroube**, en cas de régurgitations sévères et persistantes et RGO*

**Caroube
+ BB-12®**

Naissance 6 mois 12 mois

BESOIN D'UNE
TÉTINE ADAPTÉE



3551101548016



3551101547576



3551101547705

= 400 g
= 800 g



**Efficacité sur les reflux
Caroube**
Fort pouvoir épaississant¹



**Tolérance
Ferments lactiques BB-12®**
• Renforcent le microbiote intestinal²
• Améliorent le confort digestif³



ARA et DHA
Développement cérébral et visuel⁴

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une formule répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.

Picot AR est une DADFMS pour les besoins nutritionnels en cas de régurgitations ou de reflux gastro-œsophagien (RGO) grâce à sa formule épaissie à la caroube. **Picot AR - 1^{er} âge** convient à l'alimentation des nourrissons de 0 à 6 mois quand ils ne sont pas allaités et peut être utilisé comme seule source d'alimentation.

Picot AR - 2^{ème} âge est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois et ne peut pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé.

A utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas être administré par voie parentérale. Ne peut constituer la seule source d'alimentation de votre enfant.

DENRÉES ALIMENTAIRES DESTINÉES À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES

* Reflux Gastro-Œsophagien

1. Borrelli O, et al. Use of a new thickened formula for treatment of symptomatic gastroesophageal reflux in infants. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1997 Jun;29(3):237-42. 2. Mohan R, et al. Effects of Bifidobacterium lactis Bb12 supplementation on intestinal microbiota of preterm infants: a double-blind, placebo-controlled, randomized study. J Clin Microbiol. 2006 Nov;44(11):4025-31. 3. Zartl B, et al. Fermentation of non-digestible raffinose family oligosaccharides and galactomannans by probiotics. Food Funct. 2018 Mar 1;9(3):1638-1646. 4. Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		1 ^{er} âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%	2 ^e âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%
ÉNERGIE			
	kJ	274	274
	kcal	66	66
MATIÈRES GRASSES	g	3,2	3,2
Dont acides gras saturés	g	1,1	1,1
Dont acide Linoléique	mg	432	432
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	58,1	58,1
Dont ARA	mg	8,1	8,1
Dont DHA	mg	16,2	16,2
GLUCIDES	g	7,5	7,5
Dont sucres	g	6,3	6,3
Dont lactose	g	6,3	6,3
FIBRES ALIMENTAIRES	g	0,49	0,49
PROTÉINES	g	1,5	1,5
Dont caséines	g	0,8	0,8
Dont protéines de sérum	g	0,8	0,8
SEL	g	0,05	0,05
VITAMINES			
Vitamine A	µg ER	75,6	75,6
Vitamine D	µg	1,5	1,5
Vitamine E	mg α-ET	1,4	1,4
Vitamine K	µg	4,6	4,6
Vitamine C	mg	13,5	13,5
Thiamine (B1)	µg	67,5	67,5
Riboflavine (B2)	µg	135	135
Niacine (B3/PP)	mg	1,1	1,1
Vitamine B6	µg	60,8	60,8
Folates (B9)	µg EFA	17,6	18,9
Vitamine B12	µg	0,18	0,18
Biotine (B8/H)	µg	1,8	1,8
Acide pantothénique (B5)	mg	0,54	0,54
MINÉRAUX			
Sodium	mg	21,6	21,6
Potassium	mg	81,0	81,0
Chlorure	mg	64,1	64,1
Calcium	mg	77,0	83,7
Phosphore	mg	43,2	47,3
Magnésium	mg	5,3	5,3
Fer	mg	0,69	1,1
Zinc	mg	0,68	0,68
Cuivre	µg	56,7	56,7
Manganèse	µg	40,5	40,5
Sélénium	µg	3,2	3,2
Iode	µg	16,2	16,2
Chrome	µg	< 6,6	< 6,6
Molybdène	µg	< 9,2	< 9,2
Fluorure	µg	< 131	< 131
AUTRES			
Choline	mg	24,3	24,3
Inositol	mg	6,1	6,1
L-carnitine	mg	1,5	1,5

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

AR1 : Lactose (**lait**), matières grasses végétales (palme, colza, tournesol oléique, coprah, tournesol), **lait** écrémé, maltodextrines, protéines solubles de **lait**, épaississant (farine de graines de caroube(4%)), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, chlorure de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait, soja**), huile de *Mortierella alpina* (**lait**), émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, vitamines (C, B3, B5, A, E, K, D, B1, B6, B2, B12, B9, B8), inositol, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols) (**soja**), L-cystéine, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

AR2 : Lactose (**lait**), matières grasses végétales (palme, colza, tournesol oléique, coprah, tournesol), **lait** écrémé, maltodextrines, protéines solubles de **lait**, épaississant (farine de graines de caroube(4%)), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, chlorure de magnésium, fer encapsulé (amidon de maïs, pyrophosphate ferrique, émulsifiant (lécithine de tournesol), sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait, soja**), huile de *Mortierella alpina* (**lait**), émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, vitamines (C, B3, B5, A, E, K, D, B1, B6, B2, B12, B9, B8), inositol, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols) (**soja**), L-cystéine, L-carnitine, ferments lactiques (*Bifidobacterium lactis*).

Pepti-Junior Hydrolysats de Caséine

Notre solution de référence pour la prise en charge de l'allergie aux protéines de lait de vache (APLV)

Naissance ————— 36 mois



☞ = 400 g



3551102149755

- Étude Délisa : Tolérance allergique à 100% et bonne croissance¹
- Meilleure acceptabilité du goût²



Besoins en calcium
Couverture à 100%
de 0 à 36 mois³



15% TCM*
Sources d'énergie
rapide⁴

PRISE EN CHARGE LPP**

Montant LPP : 12,96€/boîte de 400 g

Reste à charge : 7,50€

CODE LPP

6111568

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une formule répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant allergique aux protéines de lait de vache. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. **Picot Pepti Junior Hydrolysats de Caséine 0-36 mois** peut être utilisé comme seule source d'alimentation de 0 à 6 mois et est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé. À utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas être administré par voie parentérale. Ne convient pas en cas de galactosémie.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES POUR LES BESOINS NUTRITIONNELS EN CAS D'APLV

* Triglycérides à Chaînes Moyennes, sur lipides totaux. ** Liste des produits et prestations remboursables selon l'arrêté du 16/05/2003 (JO du 05/06/2003).

1. Étude DELISA (2024) : résultats sur la tolérance et la croissance chez les enfants diagnostiqués avec une allergie aux protéines de lait de vache et ayant reçu une alimentation infantile avec un hydrolysats poussé de caséine (Pepti-Junior Caséine) - En cours de publication. Résultat : 100% de tolérance et bonne croissance 2. Étude réalisée auprès de 20 parents face à des formules comparables (2024) 3. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Anses 2021. Avec une consommation de 240 ml de lait reconstitué de 0 à 6 mois, 340 ml de 6 à 12 mois et 545 ml de 12 à 36 mois 4. Yuan T, et al. Triacylglycerol containing medium-chain fatty acids (MCFA-TAG): The gap between human milk and infant formulas. August 2019. International Dairy Journal

Valeurs nutritionnelles moyennes

Pepti-Junior Caséine

pour 100 ml
reconstitués à 13,5%

ÉNERGIE	kJ	279
	kcal	67
MATIÈRES GRASSES	g	3,3
Dont acides gras saturés	g	1,5
Dont acide Linoléique	mg	401
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	33,5
Dont acide Gamma-Linolénique	mg	12,7
Dont DHA	mg	16,2
Dont TCM	g	0,50
GLUCIDES	g	7,4
Dont sucres	g	0,7
Dont lactose	g	< 0,01
PROTÉINES	g	1,9
SEL	g	0,08
VITAMINES		
Vitamine A	µg ER	78,7
Vitamine D	µg	1,6
Vitamine E	mg α-ET	1,1
Vitamine K	µg	5,5
Vitamine C	mg	10,8
Thiamine (B1)	µg	83,3
Riboflavine (B2)	µg	130
Niacine (B3/PP)	mg	0,66
Vitamine B6	µg	55,5
Folates (B9)	µg EFA	25,5
Vitamine B12	µg	0,15
Biotine (B8/H)	µg	2,4
Acide pantothénique (B5)	mg	0,51
SELS MINÉRAUX		
Sodium	mg	32,4
Potassium	mg	77,0
Chlorure	mg	47,3
Calcium	mg	82,6
Phosphore	mg	45,9
Magnésium	mg	6,8
Fer	mg	0,81
Zinc	mg	0,74
Cuivre	µg	68,2
Manganèse	µg	46,8
Sélénium	µg	4,7
Iode	µg	18,4
Chrome	µg	< 4,1
Molybdène	µg	< 4,1
Fluorure	µg	< 66,6
AUTRES		
Choline	mg	21,6
Inositol	mg	6,1
L-Carnitine	mg	1,5
Taurine	mg	4,3

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

Maltodextrine, huiles végétales (**soja**, coco, huile de tournesol oléique, bourrache), hydrolysats poussés de caséine (**lait**), triglycérides à chaîne moyenne (TCM), minéraux (phosphate de calcium, hydroxyde de calcium, chlorure de magnésium, hydroxyde de potassium, chlorure de potassium, citrate de sodium, citrate de calcium, carbonate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iode de potassium, sélénite de sodium), émulsifiants (esters citriques de mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine de **soja**), huile extraite de microalgue *Schizochytrium* sp, chlorure de choline, vitamines (C, E, B3, B5, A, B12, B2, D, B6, B1, K, B8, B9), L-cystine, L-tryptophane, inositol, L-histidine, taurine, L-carnitine.

Pepti-Junior Hydrolysât de Caséine AR

Notre solution de référence pour la prise en charge de l'allergie aux protéines de lait de vache (APLV) associée à des régurgitations

Naissance 36 mois



= 400 g



3551102149946

- **Efficacité sur les régurgitations¹ et tolérance digestive² Caroube**
 - Fort pouvoir épaississant³
 - Juste teneur (3,3%)
- **Étude DéliSa : tolérance allergique à 100% et bonne croissance⁴**
- **Meilleure acceptabilité du goût⁵**



Besoins en calcium
Couverture à 100%
de 0 à 36 mois⁶



15% TCM*
Sources d'énergie
rapide⁷

PRISE EN CHARGE LPP**

Montant LPP : 12,96 €/boîte de 400g.

Reste à charge : 7,50€

CODE LPP

6111568

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une formule répondant aux besoins nutritionnels de votre enfant avec une allergie aux protéines de lait de vache associée à des régurgitations ou des reflux gastro-œsophagiens. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. **Picot Pepti-Junior Hydrolysât de Caséine AR 0 - 36 mois** peut être utilisé comme source d'alimentation de 0 à 6 mois et est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé. A utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas être administré par voie parentérale. Ne convient pas en cas de galactosémie.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES POUR LES BESOINS NUTRITIONNELS EN CAS D'APLV ASSOCIÉE À DES RÉGURGITATIONS

* Triglycérides à Chaînes Moyennes, sur lipides totaux ** Liste des produits et prestations remboursables selon l'arrêté du 16/05/2003 (JO du 05/06/2003). 1. Borrelli O, et al. Use of a new thickened formula for treatment of symptomatic gastroesophageal reflux in infants. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1997 Jun;29(3):237-42. 2. Meunier L, et al. Locust bean gum safety in neonates and young infants: an integrated review of the toxicological database and clinical evidence. Regul Toxicol Pharmacol. 2014 Oct;70(1):155-69. 3. Rosen R, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Mar;66(3):516-554. 4. Étude DELISA (2024) : résultats sur la tolérance et la croissance chez les enfants diagnostiqués avec une allergie aux protéines de lait de vache et ayant reçu une alimentation infantile avec un hydrolysât poussé de caséine (Pepti-Junior Caséine). Résultat : 100% de tolérance et bonne croissance. Allergol Immunopathol (Madr). 2026;54(1):212-220. 5. Étude réalisée auprès de 20 parents face à des formules comparables (2024) 6. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Anses.2021. Avec une consommation de 250 ml de lait reconstitué de 0 à 6 mois, 350 ml de 6 à 12 mois et 565 ml de 12 à 36 mois 7. Yuan T, et al. Triacylglycerol containing medium-chain fatty acids (MCF-A-TAG): The gap between human milk and infant formulas. August 2019. International Dairy Journal.

Valeurs nutritionnelles moyennes

Pepti-Junior Caséine AR
pour 100 ml
reconstitués à 13,5%

ÉNERGIE	kJ	275
	kcal	66
MATIÈRES GRASSES	g	3,2
Dont acides gras saturés	g	1,2
Dont acide Linoléique	mg	388
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	35,9
Dont acide Gamma-Linolénique	mg	12,7
Dont DHA	mg	15,7
Dont TCM	g	0,50
GLUCIDES	g	7,2
Dont sucres	g	0,7
Dont lactose	g	<0,01
FIBRES ALIMENTAIRES	g	0,4
PROTÉINES	g	1,8
SEL	g	0,08
VITAMINES		
Vitamine A	µg-ER	76,1
Vitamine D	µg	1,6
Vitamine E	mg α-ET	1,1
Vitamine K	µg	5,4
Vitamine C	mg	9,5
Thiamine (B1)	µg	80,6
Riboflavine (B2)	µg	125
Niacine (B3/PP)	mg	0,64
Vitamine B6	µg	53,7
Folates (B9)	µg-EFA	27,2
Vitamine B12	µg	0,14
Biotine (B8/H)	µg	2,3
Acide pantothénique (B5)	mg	0,51
SEL MINÉRAUX		
Sodium	mg	31,3
Potassium	mg	74,4
Chlorure	mg	45,7
Calcium	mg	79,9
Phosphore	mg	44,4
Magnésium	mg	6,5
Fer	mg	0,78
Zinc	mg	0,72
Cuivre	µg	66,0
Manganèse	µg	45,3
Sélénium	µg	4,6
Iode	µg	17,8
Chrome	µg	<6,6
Molybdène	µg	<9,2
Fluorure	µg	<65,7
AUTRES		
Choline	mg	20,9
Inositol	mg	5,9
L-carnitine	mg	1,4
Taurine	mg	4,2

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

Maltodextrine, huiles végétales (tournesol oléique, coco, soja, bourrache), hydrolysât poussé de caséine (lait), triglycérides à chaîne moyenne (TCM), épaississant (farine de graines de caroube (3,3%)), minéraux (phosphate de calcium, hydroxyde de calcium, chlorure de magnésium, carbonate de calcium, hydroxyde de potassium, chlorure de potassium, citrate de calcium, citrate de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénite de sodium), émulsifiants (esters citriques de mono- et diglycérides d'acides gras, lécithine de soja), huile extraite de microalgue Schizochytrium sp., chlorure de choline, vitamines (C, E, B3, B5, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), L-cystine, L- tryptophane, inositol, L-histidine, taurine, L-carnitine.

Pepti-Junior Riz

Notre solution alternative pour la prise en charge de
l'allergie aux protéines de lait de vache (APLV)



- **Efficacité¹ et meilleure acceptabilité du goût²**
Reconnu comme solution de référence par l'ESPGHAN
- **Ratio ARA/DHA 1:1**
Bon développement cérébral et visuel³
- **Meilleur confort digestif & intestinal, prébiotiques FOS^{4,5,6}**



Besoins en calcium
Couverture à 100%
de 0 à 36 mois⁷



23% TCM*
Sources d'énergie
rapide⁸

Autre indication

Diarrhée/gastroentérite aiguë et/ou persistante : formule sans lactose, avec FOS^{9,10}

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une formule répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant allergique aux protéines de lait de vache. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. **Picot Pepti Junior Riz 0-36 mois** peut être utilisé comme seule source d'alimentation de 0 à 6 mois et est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé. À utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas être administré par voie parentérale. Ne convient pas en cas de galactosémie.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES POUR LES BESOINS NUTRITIONNELS EN CAS D'APLV

* Triglycérides à Chaînes Moyennes, sur lipides totaux
1. Vandenplas Y, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024 Feb;78(2):386-413. **2.** Pedrosa M, et al. J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(6):351-6. **3.** Birch EE, et al. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. **4.** Moore N, et al. Br J Nutr. 2003 Sep;90(3):581-7. **5.** Closa-Monasterolo R, et al. Clin Nutr. 2013 Dec;32(6):918-27. **6.** Christophe Ripoll, et al. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 2015 **7.** Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. ANSES, 2021 **8.** Yuan T, et al. August 2019. International Dairy Journal **9.** Lo Vecchio A, et al. Acta Paediatr. 2016 Aug;105(8):e384-9. **10.** Du Z, et al. Front Microbiol. 2023 Sep 1;14:1233840.

Valeurs nutritionnelles moyennes

Pepti-Junior Riz
pour 100 ml
reconstitués à 13,1%

ÉNERGIE	kJ	286
	kcal	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,7
Dont acides gras saturés	g	1,7
Dont acide Linoléique	mg	416
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	37,6
Dont ARA	mg	15,2
Dont DHA	mg	15,2
Dont TCM	g	0,84
GLUCIDES	g	6,9
Dont sucres	g	0,5
Dont lactose	g	< 0,01
Dont amidon	g	1,4
FIBRES ALIMENTAIRES	g	0,4
PROTÉINES	g	1,7
SEL	g	0,08
VITAMINES		
Vitamine A	µg ER	76,8
Vitamine D	µg	1,8
Vitamine E	mg α-ET	1,7
Vitamine K	µg	6,9
Vitamine C	mg	11,0
Thiamine (B1)	µg	79,9
Riboflavine (B2)	µg	124
Niacine (B3/PP)	mg	0,64
Vitamine B6	µg	53,7
Folates (B9)	µg EFA	26,9
Vitamine B12	µg	0,14
Biotine (B8/H)	µg	2,2
Acide pantothénique (B5)	mg	0,50
SELS MINÉRAUX		
Sodium	mg	31,6
Potassium	mg	65,4
Chlorure	mg	55,0
Calcium	mg	66,3
Phosphore	mg	42,8
Magnésium	mg	6,0
Fer	mg	0,79
Zinc	mg	0,90
Cuivre	µg	57,6
Manganèse	µg	21,0
Sélénium	µg	4,6
Iode	µg	16,2
Chrome	µg	< 5,2
Molybdène	µg	< 5,2
Fluorure	µg	< 13,1
AUTRES		
Choline	mg	22,0
Inositol	mg	3,9
L-Carnitine	mg	2,0
Taurine	mg	6,0
Nucléotides	mg	2,9

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

Maltodextrine, huiles végétales (tournesol hautement oléique, tournesol, coprah, colza), protéines de riz hydrolysées, amidons, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), fructo-oligosaccharides, minéraux (phosphate de potassium, chlorure de calcium, hydroxyde de calcium, phosphate de sodium, chlorure de magnésium, citrate de calcium, phosphate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iode de potassium, sélénite de sodium), émulsifiant (esters citriques de mono- et diglycérides d'acides gras), huile extraite de la microalgue *Schizochytrium sp.*, huile de *Mortierella alpina*, L-lysine, vitamines (C, E, B3, B5, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), chlorure de choline, L-tryptophane, taurine, nucléotides (cytidine 5' monophosphate, uridine 5' monophosphate, adénosine 5' monophosphate, guanosine 5' monophosphate, inosine 5' monophosphate), inositol, L-carnitine.



Pepti-Junior Riz AR

Notre solution alternative pour la prise en charge
de l'allergie aux protéines de lait de vache (APLV)
associée à des régurgitations



- **Efficacité¹ et bonne acceptabilité du goût²**
Reconnu comme solution de référence par l'ESPGHAN
- **Efficacité sur les régurgitations^{3,4,5} et tolérance digestive⁶**
Mix amidon 9,3% et caroube 1,5%
Prébiotiques FOS^{7,8}

ARA/DHA Ratio 1:1⁹

Besoins en calcium
Couverture à 100% de 0 à 36 mois¹⁰

23% TCM*
Sources d'énergie rapide¹¹

Autre indication

Diarrhée/gastroentérite aigüe et/ou persistante : formule sans lactose, avec FOS^{12,13}

AVIS IMPORTANT

Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une formule répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant avec une allergie aux protéines de lait de vache associée à des régurgitations ou des reflux gastro-oesophagiens. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. **Picot Pepti Junior Riz AR 0-36 mois** peut être utilisé comme seule source d'alimentation de 0 à 6 mois et est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé. À utiliser sous contrôle médical. Ne doit pas être administré par voie parentérale. Ne convient pas en cas de galactosémie.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES POUR LES BESOINS NUTRITIONNELS EN CAS D'APLV ASSOCIÉE À DES RÉGURGITATIONS

*Triglycérides à Chaînes Moyennes, sur lipides totaux.
1. Vandenplas Y, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024 Feb;78(2):396-413. 2. Pedrosa M, et al. J Investig Allergol Clin Immunol. 2006;16(6):351-6. 3. Rosen R, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Mar;66(3):516-554. 4. Borrelli O, et al. Ital J Gastroenterol Hepatol. 1997 Jun;29(3):237-42. 5. Xinias I, et al. Curr Ther Res Clin Exp. 2003 Apr;64(4):270-8. 6. Moore N, et al. Br J Nutr. 2003 Sep;90(3):581-7. 7. Closa-Monasterolo R, et al. Clin Nutr. 2013 Dec;32(6):918-27. 8. Christophe Ripoll, et al. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre. 2015 9. Birch EE, et al. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. 10. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. ANSES. 2021 11. Yuan T, et al. August 2019. International Dairy Journal 12. Lo Vecchio A, et al. Acta Paediatr. 2016 Aug;105(8):e384-9. 13. Du Z et al. Front Microbiol. 2023 Sep 1;14:1233840.

Valeurs nutritionnelles moyennes

Pepti-Junior Riz AR
pour 100 ml
reconstitués à 13,5%

ÉNERGIE	kJ	284
	kcal	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,7
Dont acides gras saturés	g	1,7
Dont acide Linoléique	mg	416
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	37,6
Dont ARA	mg	15,2
Dont DHA	mg	15,2
Dont TCM	g	0,84
GLUCIDES	g	6,7
Dont sucres	g	0,5
Dont amidon	g	1,2
FIBRES ALIMENTAIRES	g	0,6
PROTÉINES	g	1,7
SEL	g	0,08
VITAMINES		
Vitamine A	µg ER	76,8
Vitamine D	µg	1,8
Vitamine E	mg α-ET	1,7
Vitamine K	µg	6,9
Vitamine C	mg	11,0
Thiamine (B1)	µg	79,9
Riboflavine (B2)	µg	123
Niacine (B3/PP)	mg	0,64
Vitamine B6	µg	52,4
Folates (B9)	µg EFA	26,9
Vitamine B12	µg	0,14
Biotine (B8/H)	µg	2,2
Acide pantothénique (B5)	mg	0,50
SELS MINÉRAUX		
Sodium	mg	31,6
Potassium	mg	65,4
Chlorure	mg	55,0
Calcium	mg	66,3
Phosphore	mg	42,8
Magnésium	mg	6,0
Fer	mg	0,79
Zinc	mg	0,90
Cuivre	µg	57,6
Manganèse	µg	21,0
Sélénium	µg	4,6
Iode	µg	16,2
Chrome	µg	<5,2
Molybdène	µg	<5,2
Fluorure	µg	<13,1
AUTRES		
Choline	mg	22,0
Inositol	mg	3,9
L-Carnitine	mg	2,0
Taurine	mg	6,0
Nucléotides	mg	2,9

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

Maltodextrine, huiles végétales (tournesol hautement oléique, tournesol, coprah, colza), protéines de riz hydrolysées, amidons, triglycérides à chaîne moyenne (TCM), fructo-oligosaccharides, minéraux (phosphate de dipotassique, chlorure de calcium, hydroxyde de calcium, phosphate de sodium, chlorure de magnésium, citrate tricalcique, phosphate dicalcique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iode de potassium, sélénite de sodium), émulsifiant (esters citriques des mono- et diglycérides d'acides gras), épaississant (farine de graines de caroube (1,5%)), huile extraite de la microalgue *Schizochytrium* sp., huile de *Mortierella alpina*, L-lysine, vitamines (C, E, B3, B5, B2, A, B1, B6, B9, K, B8, D, B12), chlorure de choline, L-tryptophane, taurine, nucléotides (cytidine 5' monophosphate, uridine 5' monophosphate, adénosine 5' monophosphate, guanosine 5' monophosphate, inosine 5' monophosphate), inositol, L-carnitine.



Desserts SANS LAIT

Aliments pour bébé à texture crème dessert destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, dès 6 mois



SANS
LACTOSE



SANS
GLUTEN



SANS
LAIT



SANS
CONSERVATEUR*



SANS
COLORANT*

SOURCE DE CALCIUM

1 POT = 25%
des besoins
en calcium

d'un nourrisson
de 6 à 12 mois¹

1 POT = 45%
des besoins
en oméga 3

d'un nourrisson
de 6 à 12 mois²

* Conformément à la réglementation relative aux aliments pour bébés.

¹ Pour un pot de 100g, besoins = apports satisfaisants en calcium selon les recommandations de l'ANSES - juin 2019, 65mg de calcium /100g de dessert Pepti-Junior ² Pour un pot de 100g, besoins moyens en acide alpha-linolénique selon l'EFSA - 2013. Dans 100g de produit, présence de 0,19g d'acide alpha-linolénique (ALA). ³ GFHGNP (2017). Diarrhée aiguë du nourrisson et de l'enfant : recommandations.

CONSEILLÉS POUR LES CAS DE :

- **Allergie aux protéines de lait de vache** quelle que soit la formule donnée (hydrolysats de lait, de riz ou acides aminés). Ne remplace pas l'hydrolysat.
- **Diarrhées sévères³** en complément d'un soluté de réhydratation orale (SRO).
- **Alimentation nécessitant un apport contrôlé en protéines et/ou lactose.**

Valeurs nutritionnelles moyennes

		Abricot pour 100g	Fraise pour 100g	Cacao pour 100g	Banane pour 100g
ÉNERGIE	kJ	352	352	360	352
	kcal	84	84	86	84
MATIÈRES GRASSES	g	2,3	2,3	2,7	2,3
Dont acides gras saturés	g	0,2	0,2	0,5	0,2
GLUCIDES	g	15,4	15,4	14,5	15,4
Dont sucres	g	5,0	4,0	3,2	4,0
PROTÉINES	g	0,3	0,3	0,8	0,3
SEL	g	0,03	0,03	0,03	0,03
SELS MINÉRAUX					
Sodium	mg	10,0	10,0	10,0	10,0
Calcium (16,3% des VRE)	mg	65,0	65,0	65,0	65,0

Lactose : <0,01 g pour 100 g

VRE : Valeurs de Référence pour l'Étiquetage

Ingrédients Abricot : Eau, sucre, maltodextrine, amidon modifié, farine de riz, huile de colza, poudre d'abricot (2,0%) (équivalent fruit 5%), arôme naturel, citrate de calcium, épaississant (farine de graines de caroube).

Ingrédients Fraise : Eau, maltodextrine, amidon modifié, sucre, farine de riz, huile de colza, arôme naturel de fraise avec autres arômes naturels, poudre de fraise (0,7%) (équivalent fruit 5%), citrate de calcium, épaississant (farine de graines de caroube), émulsifiant (lécithine).

Ingrédients Cacao : Eau, maltodextrine, amidon modifié, sucre, farine de riz, huile de colza, cacao en poudre (1,9%), citrate de calcium, épaississant (farine de graines de caroube).

Ingrédients Banane : Eau, maltodextrine, amidon modifié, sucre, farine de riz, huile de colza, poudre de banane (1,2%) (équivalent fruit 7,9%), arôme naturel de banane avec autres arômes naturels, citrate de calcium, épaississant (farine de graines de caroube).

** Présence possible de **céréales** contenant du **gluten, soja**.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Avant ouverture, conserver à température ambiante.

MODE D'EMPLOI :

Peut être placé au réfrigérateur 24 à 48 heures avant consommation. Jeter le reste du dessert sans lait non terminé.

Boudoirs SANS LAIT

Mes 1^{ers} boudoirs sans lait, biscuits adaptés aux nourrissons et enfants en bas âge, dès 8 mois



3551100751189

16 x 25 g = 150 g

AIDE À LA
PERCÉE
DES DENTS

SANS
HUILE DE
PALME



Les boudoirs Pepti-Junior peuvent être conseillés par les allergologues dans la réintroduction des protéines d'œuf chez les nourrissons ou enfants allergiques :

1 BOUDOIR = 0,24 g de protéines d'œuf¹

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À partir de 8 mois, adapté dans le cadre de la diversification alimentaire des bébés et également des nourrissons allergiques aux protéines de lait de vache (APLV).

Bébé est prêt à manger mes 1^{ers} Boudoirs Picot s'il :

- Se tient assis et mange tout seul,
- Consomme des plats avec des petits morceaux et sait manger du pain.

Pour sa sécurité, et quel que soit son éveil, c'est sous la surveillance d'un adulte et en position assise que bébé devra déguster ses biscuits.

* Conformément à la réglementation relative aux aliments pour bébés.

1. Calcul effectué d'après les données Ciquai 2020, 100 g d'œuf = 13 g de protéines.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		Mes 1 ^{ers} Boudoirs SANS LAIT pour 100 g	Mes 1 ^{ers} Boudoirs SANS LAIT par boudoir
ÉNERGIE			
	kJ	1966	123
	kcal	467	29
MATIÈRES GRASSES	g	14,2	0,9
Dont acides gras saturés	g	1,7	0,1
GLUCIDES	g	77,0	4,8
Dont sucres	g	32,5	2,0
FIBRES ALIMENTAIRES	g	2,0	0,1
PROTÉINES	g	6,8	0,4
SEL	g	0,1	0,01
VITAMINES			
Thiamine (B1)	mg	0,50 (100% des VRE)	0,03 (6,3% des VRE)

Lactose : <0,01 g pour 100 g VRE : Valeurs de Référence pour l'Etiquetage

Ingrédients : Farine de **blé** (31%), sucre, **œufs** (29%), amidon de **blé**, huile de colza, arôme naturel de vanille, poudres à lever (carbonates d'ammonium, tartrate de potassium), vitamine B1. Traces possibles de **soja**, de **graines de sésame** et de **fruits à coque**.



Nutrition quotidienne BIO

Laits infantiles répondant aux besoins
nutritionnels spécifiques de bébé*



Picot BIO 1 / 0-6 mois
3551101545374

Picot BIO 1 / 6-12 mois
3551101545381

= 800 g

Convient
en relais
de l'allaitement
maternel**

SANS
HUILE DE
PALME



Lipides laitiers (crème de lait) :
Profil en acide gras plus proche du lait maternel^{1,2}



DHA* :
Bon développement cérébral et visuel³



Fibres GOS / FOS :
aident à améliorer le confort digestif et
favorisent les selles souples de bébé⁴

RÉGLEMENTATION BIO

- >95% des ingrédients
issus de l'agriculture
biologique***



Valeurs nutritionnelles moyennes

		1 ^{er} âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%	2 ^e âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%
ÉNERGIE			
	kJ	281	278
	kcal	67	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,5	3,4
Dont acides gras saturés	g	1,4	1,4
Dont acide Linoléique	mg	446	446
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	45,9	45,9
Dont DHA	mg	16,2	16,2
GLUCIDES	g	7,4	7,5
Dont sucres	g	5,7	3,7
Dont lactose	g	5,5	3,6
FIBRES	g	0,4	0,4
Dont GOS	g	0,4	0,4
Dont FOS	g	0,04	0,04
PROTÉINES	g	1,3	1,3
Dont caséines	g	0,7	0,9
Dont protéines de sérum	g	0,7	0,4
VITAMINES			
Vitamine A	µg ER	52,0	51,3
Vitamine D	µg	1,5	1,5
Vitamine E	mg α-ET	2,2	2,2
Vitamine K	µg	8,1	9,5
Vitamine C	mg	10,8	7,0
Thiamine (B1)	µg	94,5	90,5
Riboflavine (B2)	µg	176	173
Niacine (B3/PP)	mg	0,66	0,65
Vitamine B6	µg	60,8	60,8
Folates (B9)	µg EFA	21,2	21,1
Vitamine B12	µg	0,22	0,22
Biotine (B8/H)	µg	2,7	2,4
Acide pantothénique (B5)	mg	0,47	0,43
SELS MINÉRAUX			
Sodium	mg	28,4	33,5
Potassium	mg	74,3	75,7
Chlorure	mg	60,8	57,4
Calcium	mg	57,4	54,0
Phosphore	mg	40,5	41,2
Magnésium	mg	6,1	6,1
Fer	mg	0,54	0,63
Zinc	mg	0,51	0,47
Cuivre	µg	47,3	46,6
Manganèse	µg	13,5	11,1
Sélénium	µg	3,9	3,4
Iode	µg	13,5	14,9
Fluorure	µg	< 67,1	< 66,6
AUTRES			
Choline	mg	22,4	-
Inositol	mg	6,8	-
L-carnitine	mg	3,4	-

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

1^{er} âge : Lactosérum déminéralisé* (**lait**), matières grasses végétales (coprah*, tournesol oléique*, colza*, tournesol*), **lait** écrémé*, maltodextrine*, crème de **lait***, fibres (galacto-oligosaccharides* (**lait**), fructo-oligosaccharides*), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate disodique, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, citrate tripotassique, hydroxyde de potassium, citrate tricalcique, chlorure de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, carbonate de calcium, sélénite de sodium, iode de potassium, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait, soja**), chlorure de choline, vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B1, D, B12, B6, B2, B9, B8), L-tyrosine, inositol, L-carnitine, L-tryptophane, antioxydants (extrait riche en tocophérols).

2^{ème} âge : Maltodextrine*, **lait** écrémé*, matières grasses végétales (coprah*, tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lactosérum déminéralisé* (**lait**), crème de **lait***, fibres (galacto-oligosaccharides* (**lait**), fructo-oligosaccharides*), minéraux (phosphate disodique, citrate tricalcique, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de sodium, carbonate de calcium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iode de potassium, sulfate de manganèse), huile de **poisson** (**lait, soja**), L-tryptophane, vitamines (E, C, B3, B5, K, A, B1, B12, D, B2, B6, B9, B8), antioxydants (extrait riche en tocophérols).

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

* Conformément à la réglementation relative aux préparations infantiles. ** Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. *** Conformément à la réglementation relative à l'agriculture biologique. **1.** Manios Y, et al. Effect of milk fat-based infant formulae on stool fatty acid soaps and calcium excretion in healthy term infants: a double-blind randomised cross-over trial. BMC Nutr. 2020 Sep 14;6:46. **2.** Gianni ML, et al. No effect of adding dairy lipids or long chain polyunsaturated fatty acids on formula tolerance and growth in full term infants: a randomized controlled trial. BMC Pediatr. 2018 Jan 22;18(1):10. **3.** Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. **4.** Moro G, et al. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002 Mar;34(3):291-5.



Croissance BIO⁺

Pour les bébés bien portants dès 10 mois



3551101545398

= 800 g

Convient en relais de l'allaitement maternel^{1,2}

SANS
HUILE DE
PALME

▲ LE CALCIUM ET LA VITAMINE D SONT NÉCESSAIRES À UNE CROISSANCE ET À UN DÉVELOPPEMENT OSSEUX NORMAUX DES ENFANTS*



Lipides laitiers (crème de lait) : Profil en acide gras plus proche du lait maternel^{1,2}



DHA* : Bon développement cérébral et visuel³



Fibres GOS / FOS : aident à améliorer le confort digestif et favorisent les selles souples de bébé⁴

RÉGLEMENTATION BIO

- ≥95 % des ingrédients issus de l'agriculture biologique***



Picot Croissance apporte :

- 11 fois plus de fer (contribue au fonctionnement normal du système immunitaire)
- 2,6 fois moins de protéines
- 17,7 fois plus d'acides gras essentiels

que le lait demi-écrémé UHT⁵

Ce produit doit être utilisé dans le cadre d'une alimentation diversifiée.

Valeurs nutritionnelles moyennes

Dès 10 mois

pour 100 ml reconstitués à 13,5%

ÉNERGIE	kJ	279
	kcal	67
MATIÈRES GRASSES	g	3,4
Dont acides gras saturés	g	1,4
Dont acide Linoléique	mg	446
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	45,9
Dont DHA	mg	16,2
GLUCIDES	g	7,5
Dont sucres	g	3,7
Dont lactose	g	3,6
FIBRES	g	0,4
Dont GOS	g	0,4
Dont FOS	g	0,04
PROTÉINES	g	1,3
Dont caséines	g	0,9
Dont protéines de sérum	g	0,4
VITAMINES		
Vitamine A	µg ER	50,9
Vitamine D	µg	1,5
Vitamine E	mg α-ET	2,1
Vitamine K	µg	9,5
Vitamine C	mg	6,8
Thiamine (B1)	µg	90,2
Riboflavine (B2)	µg	171
Niacine (B3/PP)	mg	0,65
Vitamine B6	µg	60,1
Folates (B9)	µg EFA	21,1
Vitamine B12	µg	0,20
Biotine (B8/H)	µg	2,4
Acide pantothénique (B5)	mg	0,43
SELS MINÉRAUX		
Sodium	mg	32,9
Potassium	mg	74,8
Chlorure	mg	56,7
Calcium	mg	60,8
Phosphore	mg	44,6
Magnésium	mg	5,9
Fer	mg	0,92
Zinc	mg	0,46
Cuivre	µg	45,9
Manganèse	µg	11,7
Sélénium	µg	3,1
Iode	µg	13,5
Fluorure	µg	< 66,6

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

Maltodextrine*, lait écrémé*, matières grasses végétales (coprah*, tournesol oléique*, colza*, tournesol*), lactosérum déminéralisé* (lait), crème de lait*, fibres (galacto-oligosaccharides* (lait), fructo-oligosaccharides*), minéraux (phosphate disodique, citrate tricalcique, sulfate ferreux, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, carbonate de calcium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de manganèse), huile de poisson (lait, soja), L-tryptophane, vitamines (E, C, B3, B5, K, A, B1, B12, D, B2, B6, B9, B8), antioxydants (extrait riche en tocophérols).

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

* Conformément à la réglementation relative aux préparations de suite. ** Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. *** Conformément à la réglementation relative à l'agriculture biologique.

1. Manios Y, et al. Effect of milk fat-based infant formulae on stool fatty acid soaps and calcium excretion in healthy term infants: two double-blind randomised cross-over trials. BMC Nutr. 2020 Sep 14;6:46. 2. Gianni ML, et al. No effect of adding dairy lipids or long chain polyunsaturated fatty acids on formula tolerance and growth in full term infants: a randomized controlled trial. BMC Pediatr. 2018 Jan 22;18(1):10. 3. Birch EE, et al. The DIAMOND (DHA Intake And Measurement Of Neural Development) Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):848-59. 4. Moro G, et al. Dosage-related bifidogenic effects of galacto- and fructooligosaccharides in formula-fed term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002 Mar;34(3):291-5. 5. Lait demi-écrémé UHT, Ciquel 2025.

Bébé Gourmand

Lorsque bébé a toujours faim
ou fait la fine bouche



3551101547910



3551101547927

 = 800 g

SANS
HUILE DE
PALME



**Formule savoureuse, élaborée pour
maintenir la consommation** des bébés en lait
infantile au moment de la diversification,
sans apport calorique supplémentaire*



DHA :
Bon développement cérébral et visuel¹



Prédominance des caséines,
avec glucides complexes



* En comparaison avec une formule standard de nutrition quotidienne.
1. Birch, E. E., et al. (2010). The DIAMOND Study: a double-masked, randomized controlled clinical trial of the maturation of infant visual acuity as a function of the dietary level of docosahexaenoic acid. The American journal of clinical nutrition, 91(4), 848-859.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		1 ^{er} âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%	2 ^e âge pour 100 ml reconstitués à 13,5%
ÉNERGIE	kJ	286	286
	kcal	68	68
MATIÈRES GRASSES	g	3,5	3,5
Dont acides gras saturés	g	1,5	1,5
Dont acide Linoléique	mg	473	473
Dont acide Alpha-Linolénique	mg	56,7	56,7
Dont DHA	mg	16,2	16,2
GLUCIDES	g	7,6	7,7
Dont sucres	g	5,9	5,4
Dont lactose	g	5,6	4,6
Dont amidon	g	0,8	0,5
PROTÉINES	g	1,5	1,5
Dont caséines	g	0,9	1,2
Dont protéines de sérum	g	0,6	0,3
VITAMINES			
Vitamine A	µg ER	52,0	52,0
Vitamine D	µg	1,5	1,5
Vitamine E	mg α-TE	2,3	2,3
Vitamine K	µg	8,1	8,1
Vitamine C	mg	10,8	10,8
Thiamine (B1)	µg	94,5	94,5
Riboflavine (B2)	µg	182	169
Niacine (B3/PP)	mg	0,68	0,68
Vitamine B6	µg	60,8	60,8
Folates (B9)	µg EFA	24,8	24,8
Vitamine B12	µg	0,23	0,23
Biotine (B8/H)	µg	2,7	2,7
Acide pantothénique (B5)	mg	0,47	0,47
MINÉRAUX			
Sodium	mg	33,8	33,8
Potassium	mg	74,3	74,3
Chlorure	mg	60,8	60,8
Calcium	mg	64,8	64,8
Phosphore	mg	42,5	42,5
Magnésium	mg	6,8	6,8
Fer	mg	0,54	0,54
Zinc	mg	0,54	0,54
Cuivre	µg	47,3	47,3
Manganèse	µg	13,5	13,5
Sélénium	µg	4,1	4,1
Iode	µg	13,5	13,5
Fluorure	µg	< 68,3	< 68,3
AUTRES			
Choline	mg	25,7	-
Inositol	mg	6,8	-
L-carnitine	mg	2,0	-

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires

Ingrédients :

1^{er} âge : Matières grasses végétales (coprah, tournesol oléique, colza, tournesol), lactosérum déminéralisé (**lait**), **lait** écrémé, lactose (**lait**), maltodextrines, amidon, minéraux (citrate trisodique, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, citrate tripotassique, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de **poisson (soja, lait)**, émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, B8), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols) (**soja**), inositol, L-tryptophane, L-cystéine, L-carnitine.

2^{ème} âge : **Lait** écrémé, matières grasses végétales (coprah, tournesol oléique, colza, tournesol), lactose (**lait**), maltodextrines, miel (5%), amidon, huile de **poisson (lait, soja)**, minéraux (citrate trisodique, phosphate tricalcique, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), émulsifiant (lécithine de **soja**), vitamines (C, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols)(**soja**).

Picolite®

Soluté de réhydratation orale pour les besoins nutritionnels en cas de diarrhées et vomissements, dès la naissance



3551101360489

Apport énergétique

Glucides à courtes et moyennes chaînes :

- 26 à 31% de l'apport énergétique total¹
- 64kcal/200ml : vise à compenser la diminution de l'apport énergétique²

Goût

- Apport de saccharose pour l'acceptabilité du produit²

Favorise l'hydratation³

- Électrolytes : compenser les pertes électrolytiques
- Glucose : favoriser l'absorption du sodium et de l'eau
- Faible osmolarité* : 232 mOsmol/L de solution prête à l'emploi

Acidose métabolique

- Citrates : prévention ou prise en charge de l'acidose métabolique²

Conforme aux dernières recommandations ESPGHAN³

- Sur la formulation
- Sur les conseils d'utilisation

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

* Conformément à la réglementation en vigueur.

¹ Sur les 4 premières heures de prise du SRO. AET calculés selon les besoins des enfants de 0 à 5 ans. ² HAS, Avis de la commission, 16 octobre 2002. ³ Guarino, A., et al. (2014). European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 59(1), 132-152.

CONSEILS D'UTILISATION

- Dissoudre un sachet dans 200 ml d'eau.
- Débuter l'administration du soluté de réhydratation par voie orale dès l'apparition de la diarrhée et/ou vomissement.
- Proposer à l'enfant une quantité de 140 à 200 ml maximum/kg/24 heures de Picolite® répartie de la manière suivante :
 - 4h Les 4 premières heures :** entre 10 et 20 ml/kg/heure en doses fractionnées et régulières. Suspendre l'alimentation, sauf en cas d'allaitement.
 - 20h Les 20 heures suivantes :** entre 5 et 6 ml/kg/heure. Reprendre progressivement l'alimentation normale.
- En cas de vomissements, proposer Picolite® à l'aide d'une cuillère à café ou d'une pipette.
- Ne jamais rajouter ou substituer par du sucre, des sirops, sodas, jus de fruits, etc.
- En cas d'échec par voie orale, utiliser une sonde nasogastrique.

PRISE EN CHARGE LPP**

Montant LPP : 6,20€/étui de 180g pour les enfants de 0 à 5 ans.

CODE LPP

6184751

Valeurs nutritionnelles moyennes

		pour 100 g	1 sachet de 18 g dans 200 ml d'eau
VALEUR ÉNERGÉTIQUE			
	kJ	1513	272
	kcal	356	64
GLUCIDES	g	89,0	16,0
Dont saccharose	g	15,0	2,7
SEL	g	3,5	0,63
MINÉRAUX			
Sodium	mg	1414	255
Potassium	mg	978	176
Chlorure	mg	2161	389
Citrate	mg	2412	434

Contient des quantités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés et de protéines.

Ingrédients : maltodextrine, saccharose, chlorure de sodium, citrate de potassium, acide citrique.

AVIS IMPORTANT

Picolite ne doit pas être utilisé comme seule source d'alimentation. À utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels en cas de diarrhées et vomissements chez l'enfant et le nourrisson dès la naissance. Ne convient pas aux enfants et nourrissons en bonne santé. Ne pas utiliser par voie parentérale.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES

** Liste de produits et prestations remboursables selon l'arrêté du 16/05/2003 (JO du 05/06/2003).

Magic Mix | DÈS LA NAISSANCE

Poudre épaississante **de 0 à 3 ans**. Pour les nourrissons et enfants en bas âge souffrant de reflux gastro-œsophagiens



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS



SANS LAIT*
SANS GLUTEN

50% Amidon 50% Maltodextrine

= 350 g

INDICATIONS

- Magic Mix est un épaississant utilisable en pédiatrie au biberon en cas de régurgitations modérées à sévères et persistantes.
- Magic Mix épaissit les préparations infantiles sans en altérer le goût ni la couleur.
- Magic Mix est destiné aux enfants de 0 à 3 ans atteints de troubles de la déglutition ou ayant des problèmes de passage du bol alimentaire.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		pour 100 g
VALEUR ÉNERGÉTIQUE	kJ	1649
	kcal	388
GLUCIDES	g	97,0
Dont sucres	g	2,9
PROTÉINES	g	0,0
SEL	g	0,1

Contient des quantités négligeables de matières grasses, acides gras saturés et protéines.


Ingrédients : Amidon de maïs, maltodextrine de maïs.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des préparations infantiles épaissies.
- Pour une bonne utilisation avec des préparations infantiles à base d'acides aminés, veuillez-vous référer à l'avis et aux indications de votre professionnel de santé.
- Ne pas dépasser les quantités indiquées dans le tableau de reconstitution.
- L'utilisation excessive du produit peut entraîner un épaississement trop important et l'apparition de grumeaux.
- La présence d'un épaississement trop important ou de grumeaux dans le biberon peut engendrer un risque d'étouffement.
- Utiliser uniquement la mesurette présente dans la boîte de Magic Mix.
- Il est conseillé d'utiliser une tétine adaptée.
- Jetez sans hésiter le reste du biberon non terminé.

MODE D'EMPLOI

Boîte de 350g + mesurette d'environ 5,5g



Âge du bébé	Eau (ml)	Quantité de Magic Mix à ajouter en nombre de graduations selon le type de préparation infantile ⁽¹⁾		
		Dans un lait pour nourrisson ou lait de suite	Dans une préparation à base de protéines de lait hydrolysées	Dans une préparation à base de protéines de riz hydrolysées
< 1 mois	90	8 graduations	1 mesurette + 1 graduations	7 graduations
1-2 mois	120	1 mesurette + 1 graduation	1 mesurette + 5 graduations	9 graduations
2-3 mois	150	1 mesurette + 4 graduations	1 mesurettes + 9 graduations	1 mesurette + 1 graduation
3-4 mois	180	1 mesurette + 6 graduations	2 mesurettes + 2 graduations	1 mesurette + 3 graduations
4-8 mois	210	1 mesurette + 9 graduations	2 mesurettes + 6 graduations	1 mesurette + 5 graduations
36 mois	240	2 mesurettes + 2 graduations	3 mesurettes	1 mesurette + 8 graduations

⁽¹⁾ Utiliser la mesurette présente dans la boîte de Magic Mix.



1 Verser la quantité d'eau froide ou tiédie à 40°C dans un biberon propre.



3 Fermer le biberon puis l'agiter 10 secondes de gauche à droite puis 10 secondes de haut en bas, sans le rouler entre les mains.



2 Ajouter le nombre correspondant de mesurettes de la réparation infantile habituelle puis la quantité recommandée de Magic Mix



4 Attendre entre 3 et 5 minutes pour un épaississement optimal.

AVIS IMPORTANT

À utiliser uniquement comme épaississant. Ne doit pas être utilisé comme seule source d'alimentation. À utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels en cas de troubles de la déglutition ou de régurgitations modérées à sévères et persistantes chez les enfants de 0 à 3 ans.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES

*Convient également pour épaissir les préparations infantiles à base de protéines hydrolysées destinées aux enfants allergiques aux protéines de lait de vache.

Magic Mix | ENFANT & ADULTE

Poudre épaississante pour les enfants
dès 3 ans et adultes souffrant de **troubles**
de la **déglutition** ou de **réurgitations**



3551101360496

 = 300 g



SANS GLUTEN
inférieur au seuil
de 20 mg/kg pour
les intolérances au gluten

INDICATIONS

- Magic Mix enfant & adulte est adapté aux patients de plus de 3 ans pour les besoins nutritionnels en cas de troubles de la déglutition ou ayant des problèmes de passage du bol alimentaire. Ce produit n'est pas adapté pour les enfants de moins de 3 ans.
- Magic Mix épaissit les boissons et les préparations liquides (chaudes ou froides), sans en altérer le goût ni la couleur.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		pour 100 g
VALEUR ÉNERGÉTIQUE	kJ	1590
	kcal	374
GLUCIDES	g	93,0
PROTÉINES	g	0,3
SEL	g	0,025
MINÉRAUX		
Sodium	mg	10

Contient des quantités négligeables de matières grasses, acides gras saturés, sucres et protéines.

Ingédient : Amidon modifié de maïs.

Présences possibles de **blé, orge, avoine, œufs, poissons, soja, lait, céleri, sulfites**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'utilisation d'une quantité excessive de produit peut entraîner l'apparition de grumeaux. Attention la présence de grumeaux peut engendrer un risque d'étouffement. Utiliser uniquement la mesurette présente dans la boîte Magic Mix.

Boîte de 300g + mesurette de 4g environ

MODE D'EMPLOI



1 Saupoudrer en pluie fine la poudre Magic Mix sur le liquide ou le plat à épaissir tout en remuant. Attendre 2 minutes pour obtenir un épaississement optimal.



2 L'épaississement varie en fonction de la quantité de poudre ajoutée (voir tableau de préparation).

Pour épaissir

**Quantité conseillée
pour 100 mL (en nombre
de mesurettes arasées)
pour une texture IDDSI* 4**

BOISSONS CHAUDES

Thé (préparé à la bouilloire à minima 70°C)	3
Café	3
Potage	2

BOISSONS FROIDES

Jus de fruits	2,5
Eau + sirop aromatisé	2
Lait	3

AUTRES

Yaourt brassé	1
Compote	1

* International Dysphagia Diet Standardisation Initiative - www.iddsi.org
Niveau 4 : aliments mixés ou boissons très épaisses

AVIS IMPORTANT

À utiliser uniquement comme épaississant. Ne doit pas être utilisé comme seule source d'alimentation. À utiliser sous contrôle médical pour les besoins nutritionnels en cas de troubles de la déglutition ou de régurgitation et de problèmes de passage du bol alimentaire. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, utiliser le Magic Mix Dès la Naissance. Ne convient pas en cas d'allergie aux protéines de lait de vache.

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES

Céréales

Céréales instantanées aromatisées,
à reconstituer pour nourrissons à partir
de 6 mois et enfants en bas âge



3551102087408



3551102087439



3551102149694



3551102087422



3551102087415



3551102087392

= 200 g

Des ingrédients soigneusement sélectionnés

- Source de calcium
- Source de vitamines*
- Sans conservateurs**

INDICATIONS

- Mes céréales Picot se préparent au biberon ou à l'assiette en les reconstituant dans le lait habituel de bébé.

* Vitamines A, D, C, B3, B6, B9. ** Conformément à la réglementation sur les céréales infantiles.

Valeurs nutritionnelles moyennes

		Saveur Cacao pour 100g	Saveur Fruits pour 100g	Biscuit pour 100g	Miel pour 100g	Multi-céréales pour 100g	Saveur Vanille pour 100g
ÉNERGIE							
	kJ	1 640	1 640	1 664	1 633	1 647	1 646
	kcal	387	387	392	385	388	388
MATIÈRES GRASSES	g	2,5	0,9	2,0	1,1	1,1	1,3
Dont acides gras saturés	g	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
GLUCIDES	g	82,2	88,5	86,8	87,2	86,8	87,2
Dont sucres	g	24,9	39,1	19,4	29,1	20,2	21,6
FIBRES ALIMENTAIRES	g	3,9	3,0	2,6	2,3	3,1	1,9
PROTÉINES	g	7,0	4,6	5,5	5,4	6,2	5,9
SEL	g	0,04	0,05	0,06	0,02	0,03	0,03
VITAMINES							
Vitamine A (105% des VRE)	µg ER	420	420	419	420	420	420
Vitamine D (75% des VRE)	µg	7,5	7,5	10,1	7,5	7,5	7,5
Vitamine E	mg α-ET	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Vitamine K	µg	25,0	25,0	41,0	25,0	25,0	25,0
Vitamine C	mg	30,0 (120% VRE)	35,0 (140% VRE)	30,0 (120% VRE)	30,0 (140% VRE)	30,0 (120% VRE)	30,0 (120% VRE)
Thiamine (B1) (120% des VRE)	mg	0,60	0,60	0,48 (96% VRE)	0,60	0,60	0,60
Niacine (B3) (56% des VRE)	mg EN	5,0	5,0	8,0 (89% VRE)	5,0	5,0	5,0
Vitamine B6 (51% des VRE)	mg	0,36	0,36	0,44 (63% VRE)	0,36	0,36	0,36
Folates (B9) (50% des VRE)	µg	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Biotine (B8)	µg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Acide pantothénique (B5)	mg	2,5	2,5	4,2	2,5	2,5	2,5
MINÉRAUX							
Sodium	mg	16,0	20,0	22,0	8,0	10,0	10,0
Calcium	mg	147 (37% VRE)	146 (37% VRE)	145 (36% VRE)	163 (41% VRE)	146 (37% VRE)	145 (36% VRE)
Phosphore	mg	193	165	183	180	182	180

ER = Équivalent Rétinol / ET = Équivalent Tocophérol / EFA = Équivalents Folates Alimentaires
VRE = Valeurs de référence pour l'étiquetage

Ingrédients Saveur Cacao : Farine de **blé** (51%), sucre, biscuits (14%) (farine de **blé**, sucre, amidon de **blé**, huiles végétales (tournesol, olive), extrait de malt, poudres à lever (bicarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium), émulsifiant (lécithine de tournesol), agent de traitement de la farine (L-cystéine), antioxydant (extrait riche en tocophérol)), amidon de maïs, cacao maigre (5%), phosphate de calcium, vitamines (C, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), arôme (vanilline). Présences possibles de **lait**, **soja**, **fruits à coque**.

Ingrédients Saveur Fruits : Farines de céréales (46,1%) (**blé** (40,8%), riz, **orge**, **avoine**, **seigle**, millet, sorgho), purée de pomme (15,4%), sucre, maltodextrine, jus d'orange concentré (3,9%), miel, jus d'ananas concentré (2,3%), amidon, pulpe de banane (1,5%), phosphate de calcium, vitamines (C, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), arôme (vanilline). Traces possibles de **lait**, **soja**.

Ingrédients Biscuit : Farines de céréales (51,3%) (**blé**, **orge**, riz, **avoine**, **seigle**, **épeautre**, **triticale**), maltodextrine, biscuits (12%) (farine de **blé**, amidon de **blé**, extrait de malt, huiles végétales (tournesol, olive), poudres à lever (bicarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium), émulsifiant (lécithine de tournesol), agent de traitement de la farine (L-cystéine), antioxydant (extrait riche en tocophérols)), minéraux (phosphate de calcium, pyrophosphate ferrique), amidon de maïs, vitamines (C, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), arôme (vanilline). Présences possibles de **lait**, **soja**.

Ingrédients Miel : Farines de céréales (63,7%) (**blé**, **orge**, riz, **avoine**, **seigle**, millet, sorgho), sucre, miel (6,4%), amidon, maltodextrine, phosphate de calcium, vitamines (C, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), arôme (vanilline). Présences possibles de **lait**, **soja**.

Ingrédients Multicéréales : Farines de céréales (65,1%) (**blé**, **orge**, riz, **avoine**, **seigle**, millet, sorgho), maltodextrine, amidon, phosphate de calcium, vitamines (C, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), arôme (vanilline). Présences possibles de **soja**, **lait**.

Ingrédients Saveur Vanille : Farines de céréales (62,9%) (**blé**, riz, **avoine**, **seigle**), maltodextrine, amidon, phosphate de calcium, vitamines (C, E, A, B3, D, B5, B8, K, B1, B9, B6), arôme (vanilline). Présences possibles de **soja**, **lait**.

Boudoirs

Quand tout va bien de 8 mois à 3 ans



6 x 25 g = 150 g



SANS
CONSERVATEUR*



SANS
COLORANT[®]



3551100266652

Valeurs nutritionnelles moyennes		Mes 1 ^{ers} Boudoirs Vanille pour 100 g	Mes 1 ^{ers} Boudoirs Vanille par boudoir
ÉNERGIE	kJ	1966	123
	kcal	467	29
MATIÈRES GRASSES	g	14,2	0,9
Dont acides gras saturés	g	1,7	0,1
GLUCIDES	g	77,0	4,8
Dont sucres	g	32,5	2,0
FIBRES ALIMENTAIRES	g	2,0	0,1
PROTÉINES	g	6,8	0,4
SEL	g	0,1	0,01
MINÉRAUX			
Sodium	mg	40,0	2,5
VITAMINES			
Thiamine (B1)	mg	0,50	0,03

Ingrédients : Farine de **blé** (31%), sucre, **œufs** (29%), amidon de **blé**, huile de colza, arôme naturel de vanille, poudres à lever (carbonates d'ammonium, tartrate de potassium), vitamine B1. Contient du **gluten** et des **œufs**. Traces possibles de **soja**, de **graines de sésame** et de **fruits à coque**.

* Conformément à la réglementation relative aux aliments pour bébés.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

À partir de 8 mois dans le cadre de la diversification alimentaire.

Votre bébé est prêt à manger mes 1^{ers} Boudoirs Picot s'il :

- Se tient assis et mange tout seul,
- Consomme des plats avec des petits morceaux et sait manger du pain.

Pour sa sécurité, et quel que soit son éveil, c'est sous la surveillance d'un adulte et en position assise que bébé devra déguster ses biscuits.

Ne convient pas pour un bébé/enfant APLV. Nous avons une alternative « Picot Pepti-Junior : Mes 1^{ers} Boudoirs sans lait » dès 8 mois également.

Notes



Tisanes d'allaitement BIO

4 saveurs intenses de tisanes pour soutenir la lactation des mamans allaitantes



Saveur
Fruits rouges BIO
355110235420



Saveur
Menthe citron BIO
3551102354937



Saveur
Mangue BIO
3551102354944



Saveur
Pomme Miel BIO
3551102354951



Des ingrédients soigneusement sélectionnés

- 84% de carvi : soutient la lactation pendant l'allaitement
- Sans fenouil (estragol) : selon les recommandations de l'agence européenne du médicament de 2023¹

Valeurs nutritionnelles moyennes

VALEUR ÉNERGÉTIQUE	kJ	3
	kcal	1

Les infusions Picot contiennent des quantités négligeables de matières grasses dont acides gras saturés, de glucides dont sucres, de protéines et de sel.

Ingrédients

Préparation pour infusion à base de carvi, aux arômes naturels de fraise, framboise et cassis :

Carvi* (fruit, *Carum carvi* L.) (85%), arômes naturels* (14,7%), fruits rouges séchés (fraise, framboise, cassis)* (0,3%).

Préparation pour infusion à base de carvi et de menthe douce, à l'arôme naturel de citron :

Carvi* (fruit, *Carum carvi* L.) (85%), menthe douce* (feuille, *Mentha spicata*) (9%), arôme naturel de citron* (5,9%), écorce de citron*.

Préparation pour infusion à base de carvi, à l'arôme naturel de mangue :

Carvi* (fruit, *Carum carvi* L.) (85%), arôme naturel de mangue* (15%).

Préparation pour infusion à base de carvi, aux arômes naturels de pomme et de miel :

Carvi* (fruit, *Carum carvi* L.) (84%), arôme naturel de pomme* (6%), arôme naturel de miel* (5%), marc de pomme* (4,8%), miel granulé* (0,2%).

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

1 Public statement on the use of herbal medicinal products containing estragole EMA/HMPC/137212/2005
Rev 1 Corr 1*

Notes







NOUVEAU

Nutrition Quotidienne



Exclusivement
en pharmacie

DADFMS*

Troubles Fonctionnels Gastro-Intestinaux



DADFMS*

NOUVEAU



Exclusivement
en pharmacie

APLV¹ et diversification sans lait

Épaississant



DADFMS*

Réhydratation



DADFMS*

Tisanes d'allaitement pour les mamans



Exclusivement
en pharmacie

Gammes complémentaires

Céréales



Boudoirs



Gamme diversification

* Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales.

1. Allergie aux protéines de lait de vache.

AVIS IMPORTANT : Le lait maternel est le meilleur aliment pour le nourrisson. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l'allaitement maternel. Les préparations infantiles sont destinées à remplacer l'allaitement maternel quand celui-ci n'est pas adapté, pas possible, arrêté prématurément ou doit être complété. Il est difficile de revenir sur le choix de ne pas allaiter et l'allaitement mixte peut gêner l'allaitement au sein. Les implications socio-économiques devraient être prises en compte dans le choix de la méthode d'allaitement. Il est important de respecter les indications de préparation et d'utilisation des préparations infantiles et de suivre les conseils du corps médical concernant l'alimentation du nourrisson. Une utilisation incorrecte de la préparation pourrait présenter un risque pour la santé de l'enfant.

LNS, 600 rue du Chalonge, Zone d'activités du Haut Montigné - 35 370 Torcé - France.

Tél : 02 99 49 20 89 - Fax : 02 99 49 61 30.

LNS - SAS au capital de 1 925 410 € - RCS RENNES 451194963 - 200000057 - 09/2026

